

สถานการณ์ สายพันธุ์เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในประเทศไทย


ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญกับการติดตาม Omicron จำนวน 8 สายพันธุ์ จากพื้นฐานของข้อมูลการเพิ่มความชุกหรือความได้เปรียบด้านอัตราการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่น ๆ และการกลายพันธุ์ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการได้เปรียบในการก่อโรค ได้แก่

- ⇒ สายพันธุ์ที่เฝ้าระวัง หรือ Variants of Interest (VOI) จำนวน 1 สายพันธุ์ ได้แก่ JN.1*
- ⇒ สายพันธุ์ที่ต้องจับตามอง หรือ Variants under monitoring (VUM) จำนวน 7 สายพันธุ์ ได้แก่ KP.2*, KP.3*, KP.3.1.1, JN.1.18*, LB.1*, XEC และ LP.8.1

สถานการณ์ทั่วโลก

สัปดาห์ที่ 2 ถึง สัปดาห์ที่ 5 ปี 2568 (6 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2568)

- ⇒ XEC มีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีอัตราการพบมากที่สุดในสัดส่วนร้อยละ 42.7
- ⇒ KP.3.1.1* มีอัตราการพบเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ 4 พบสัดส่วนร้อยละ 20.3
- ⇒ JN.1* มีอัตราการพบลดลงเล็กน้อย พบสัดส่วนร้อยละ 16.3
- ⇒ LP.8.1* มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบสัดส่วนร้อยละ 13.9



Lineage*	Countries§	Sequences§	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
VOIs						
JN.1	149	316070	14.1	15.7	16.6	16.3
VUMs						
KP.2	92	36217	0.8	0.6	0.4	0.5
KP.3	82	62126	4.8	4.1	3.9	4.0
KP.3.1.1	75	87414	23.9	22.8	20.2	20.3
JN.1.18	105	8668	0.1	0.1	0.1	0.0
LB.1	84	16104	0.2	0.2	0.2	1.2
XEC	65	39237	45.8	44.5	45.1	42.7
LP.8.1	32	3160	8.0	10.8	12.5	13.9
Recombinant	149	497812	1.8	1.1	0.7	0.9
Unassigned	71	4310	0.1	-	0.1	0.1
Others	121	37718	0.4	0.2	0.3	0.1

จากฐานข้อมูล GISAID

JN.1* ยังพบเป็นสายพันธุ์หลัก พบจำนวนทั้งหมด 1,454 ราย คิดเป็นสัดส่วนสะสม 64.97% ของสายพันธุ์ทั้งหมดที่พบในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ภาพรวมทั่วโลกที่ยังคงมี JN.1* เป็นสายพันธุ์หลัก (อ้างอิงฐานข้อมูล CoV-spectrum ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องและการเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูลสากล GISAID อย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันไทยเผยแพร่จีโนมสะสม 47,494 ราย นับตั้งแต่เริ่มสถานการณ์ระบาดโควิด 19 ในประเทศไทย เดือน มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2568