

สถานการณ์ สายพันธุ์เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในประเทศไทย

ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญกับการติดตาม Omicron จำนวน 6 สายพันธุ์ จากพื้นฐานของข้อมูลการเพิ่มความชุกหรือความได้เปรียบด้านอัตราการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่น ๆ และการกลายพันธุ์ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการได้เปรียบในการก่อโรค ได้แก่

- » **สายพันธุ์ที่เฝ้าระวัง** หรือ VARIANTS OF INTEREST (VOI) จำนวน 1 สายพันธุ์ ได้แก่ JN.1*
- » **สายพันธุ์ที่ต้องจับตามอง** หรือ VARIANTS UNDER MONITORING (VUM) จำนวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ KP.3*, KP.3.1.1 XEC และ LP.8.1


TABLE: MONTHLY PREVALENCE OF SARS-COV-2 VOIS AND VUMS, DECEMBER 2024 TO APRIL 2025

Lineage*	2024-12	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04
VOIs					
JN.1*	20.76	16.82	17.2	19.52	21.69
VUMs					
LP.8.1*	3.01	10.18	19.36	28.91	34.76
XEC*	38.71	43.87	39.29	30.88	20.1
KP.3.1.1*	29.27	22	15.68	11.24	8.89
KP.3*	5.94	4.72	4.09	3.51	2.05
LB.1	0.68	0.83	2.65	2.73	1.76
Recombinant	0.93	0.68	0.6	1.4	5.5
other	0.69	0.91	1.13	1.79	5.24

*อ้างอิงจากฐานข้อมูล GISAID

สถานการณ์ทั่วโลก (ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2567 ถึง เดือนเมษายน 2568)

- » JN.1* มีอัตราการพบเพิ่มขึ้น พบสัดส่วนร้อยละ 21.69
- » LP.8.1* มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีอัตราการพบมากที่สุดในสัดส่วนร้อยละ 34.76
- » XEC มีอัตราพบลดลงอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนร้อยละ 20.10
- » KP.3.1.1*, KP.3* และ LB.1* มี มีอัตราการพบลดลงเล็กน้อย พบสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 10



- » ประเทศไทยพบสายพันธุ์ JN.1* จำนวนทั้งหมด 1,479 ราย คิดเป็นสัดส่วนสะสม 63.92% ของสายพันธุ์ทั้งหมด นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 – 6 พฤษภาคม 2568

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องและการเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูลสากล GISAID อย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันไทยเผยแพร่จีโนมสะสม 47,571 ราย นับตั้งแต่เริ่มสถานการณ์ระบาดโควิด 19 ในประเทศไทย เดือน มกราคม 2563 ถึง 6 พฤษภาคม 2568