


สถานการณ์ สายพันธุ์เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในประเทศไทย

องค์การอนามัยโลกยังคงให้ความสำคัญกับการติดตามเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 กลุ่ม Omicron จำนวน 7 สายพันธุ์ จากข้อมูลความชุกและตำแหน่งการกลายพันธุ์ที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อความสามารถในการแพร่เชื้อ ได้แก่

- » **สายพันธุ์ที่เฝ้าระวัง** หรือ Variants of Interest (VOI) จำนวน 1 สายพันธุ์ ได้แก่ JN.1*
- » **สายพันธุ์ที่ต้องจับตามอง** หรือ Variants under monitoring (VUM) จำนวน 6 สายพันธุ์ ได้แก่ KP.3*, KP.3.1.1*, LB.1*, XEC*, LP.8.1* และ NB.1.8.1


NB.1.8.1 : มีต้นกำเนิดมาจากสายพันธุ์ลูกผสม XDV.1.5.1

- » มีการกลายพันธุ์บนโปรตีนหนาม ได้แก่ S:T22N, S:F59S, S:G184S, S:A435S, S:F456L, S:T478I, S:Q493E
- » พบครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568
- » มีอัตราการได้เปรียบในการเจริญเติบโตร้อยละ 57 (อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูล CoV-spectrum ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2568)
- » สายพันธุ์ NB.1.8.1 ถูกระบุเป็นสายพันธุ์ที่ต้องจับตามอง (VUM) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2568
- » ปัจจุบันพบใน 25 ประเทศ ทั่วโลก และยังมีจำนวนลำดับพันธุกรรม น้อยกว่าสายพันธุ์อื่นๆ
- » อาการและความรุนแรง คล้ายกับโควิด-19 สายพันธุ์อื่นๆ เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ ทั้งนี้ความรุนแรงขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล



สถานการณ์สายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 – พฤษภาคม 2568 มีจำนวนสายพันธุ์สะสม 3,279 ราย พบ

- » JN.1* : พบจำนวนผู้ป่วยสะสม 2,241 ราย (68.34%)
- » LB.1* : พบจำนวนผู้ป่วยสะสม 199 ราย (6.07%)
- » NB.1.8.1 : พบจำนวนผู้ป่วยสะสม 176 ราย (5.37%)
- » XEC* : พบจำนวนผู้ป่วยสะสม 109 ราย (3.32%)



สถานการณ์สายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทยในรอบ 30 วัน

29 เมษายน ถึง 25 พฤษภาคม 2568 จำนวน 284 ราย ผลการวิเคราะห์พบ

- » สายพันธุ์ NB.1.8.1 จำนวน 210 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.9
- » สายพันธุ์ XEC* จำนวน 39 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.7
- » สายพันธุ์ JN.1*, LP.8.1*, สายพันธุ์อื่นๆ, KP.3.1.1* และ KP.3* พบจำนวนสายพันธุ์ละ 12, 10, 7, 4 และ 2 ราย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.2, 3.5, 2.5, 1.4 และ 0.7 ตามลำดับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องและการเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูลสากล GISAID อย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันไทยเผยแพร่จีโนมสะสม 48,541 ราย นับตั้งแต่เริ่มสถานการณ์ระบาดโควิด 19 ในประเทศไทย เดือน มกราคม 2563 ถึง 4 มิถุนายน 2568